云 南 植 物 研 究 1997; 19(4): 366～368
Acta Botanica Yunnanica

河南植物区系新资料

朱长山[1] 蒋武生[2] 郭生乾[3]
([1] 河南农业大学，郑州 450002)
([2] 河南农业科学院，郑州 450002)
([3] 河南鲁山县林业局，鲁山 467300)

摘要 报道了河南植物区系种子植物 1 新记录科(Adoxaceae)、2 新记录属(*Dysophylla*, *Adoxa*), 12 新记录种，1 新记录变种和 1 新记录归化种。文中引证的标本均存河南农业大学植物标本室(HNAC)。

关键词 种子植物，地理新分布，河南

CONTRIBUTIONS TO FLORA OF HENAN

Zhu Changshan[1], Jiang Wusheng[2], Guo Shengqian[3]
([1]*Henan Agricultural University*, Zhengzhou 450002)
([2]*Henan Academy of Agricultural Sciences*, Zhengzhou 450002)
([3]*Lushan Forestry Bureau of Henan*, Lushan 467300)

Abstract This paper reports 1 family (Adoxaceae) 2 genera (*Dysophylla, Adoxa*), 12 species, 1 variety and 1 naturalize species as new records in Henan province. All these voucher specimens are preserved in the Herbarium, Henan Agricultural University (HNAC).

Key words Spermatophyta, New geographical distribution, Henan

通过多年的野外调查及对河南农业大学等单位植物标本室蜡叶标本的整理鉴定，我们又发现一些河南植物区系分布新记录类群，在此报道如下。

虎耳草科 Saxifragaceae

紫萼山梅花

Philadelphus purpurascens (Koehne) Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 1915(24): 220. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 64. 1924; 中国高等植物图鉴 2: 94. 图 1917. 1972; 中国植物志 35 (1) : 153. 图版 29 : 7～11. 1995.

河南：内乡，宝天曼，玉冬毅 890046；西峡，采集人不详 31317。生于海拔 1800～2000 m 山地灌丛中。

分布：四川、云南；河南首次记录。

秦榛钻地风

Schizophragma corylifolium Chun in Acta Phytotax. Sin. 3(2) : 170. Pl.21. fig. A1～A5. 1954; 中国植

1996-08-16 收稿

物志 35（1）：195. 图版 41：1～2. 1995.

河南：新县，赵天榜 78173，78317；生山谷溪边杂木林中。

分布：安徽、浙江；河南首次记录。

疏腺茶藨子

Ribes himalense Royle ex Decne. var. **glandu–losum** Jancz. in Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie Cl. Sci. Math. Nat. 1910：69. fig. 1. 1910 et Sarg. Pl. Wils. 1：44. 1913；中国植物志 35（1）：305.1995.

河南：嵩县，龙池曼，时华民 22665，4568；内乡，宝天曼，王冬毅 850037；西峡，采集人不详 34814。生海拔 1800 m 以上山坡灌丛或针叶林下。

分布：陕西、四川；河南首次记录。

簇花茶藨子

Ribes fasciculatum Sieb. et Zucc. in Abh. Bayer. Akad. Wiss. Math. Phys. 4(2)： 189 (Fam. Nat. Fl. Jap. 1：81)1945; Rehd. in Sarg. Trees et Shrubs 1： 75 tab. 38. 1903. et Man. Cult. Trees et Shrubs, 302. 1927；中国植物志 35（1）：361.1995.

河南：商城，野生经济植物组 1196；同地，采集人不详 0134。生山坡灌丛中或林下。

分布：江苏、浙江、安徽；河南首次记录。

蔷薇科 Rosaceae

刺毛白叶莓

Rubus spinulosoides Metc. in Lingn. Sci. Journ. 19：32. 1940；中国植物志 37：48.1985.

河南：卢氏，采集人不详 3049，无号。生海拔 850～1000 m 的杂木林中。

分布：湖北、山东；河南首次记录。

豆科 Leguminosae

渐尖叶鹿藿

Rhynchosia acuminatifolia Kakino in Journ. Jap. Bot. 2：4. 1920；中国主要植物图说.豆科，696.1955；中国植物志 41：334. 图版 80：3～4. 1995.

河南：商城，野生经济植物组 1370；新县，天台，赵天榜 78526。生路边草丛中或林下。

分布：安徽、江苏、浙江；河南首次记录。

杜鹃花科 Ericaceae

耳叶杜鹃

Rhododendron auriculatum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Sci. Bot. 26： 20. 1889; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1：544. 1913；中国高等植物图鉴 3：82. 图 4117. 1974；中国植物志 57（2）：41. 图版 13：1～5. 1994.

河南：舞阳，石漫滩林场，杨德宇等 0216；鲁山，石人山，朱长山等 90386。生山坡灌丛中。

分布：陕西南部、湖北西部、四川东部、贵州东北部；河南首次记录。

紫草科 Boraginaceae

湖北附地菜

Trigonotis mollis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26：153. 1890; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 18：7. 1937; 秦岭植物志 1（4）：181.图 170.1983；中国植物志 64（2）：85. 1989.

河南：内乡，宝天曼，王冬毅 86431。生海拔 1000 m 山坡草地。

分布：湖北、陕西、四川东北部；河南首次记录。

唇形科 Labiatae

水虎尾

Dysophylla stellata (Lour.) Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1：30. 1830, descr. excl.；中国植物志 66：382. 图版 79：8.1977——*Mentha stellata* Lour. Fl. Cochich. 2：361. 1790. non *M. stellata* Buch.-Ham. ex Roxb. (1832).

河南：嵩县，龙池曼，采集人不详 1177.

分布：广东、福建、江西、浙江、安徽、湖南、云南；属和种在河南均为首次记录。印度至日本、马来西亚、澳大利亚、越南亦有。

玄参科 Scrophulariaceae

轮叶马先蒿

Pedicularis verticillata L. Sp. Pl. 608. 1753；中国植物志 68：162.图版 34：4～8。1963；中国高等植物图鉴 4：57. 图 5563. 1975；秦岭植物志 1（4）：355. 1983.

河南；嵩山，叶永忠无号；生山坡草地或林下。

分布：东北及河北、内蒙、陕西、甘肃、青海、四川；河南首次记录。

五福花科 Adoxaceae

五福花

Adoxa moschatellina L. Sp. Pl. 367. 1753; Icon. Corm. Sin. 4：324. fig. 6061. 1975；秦岭植物志 1（5）：84.图 70. 1985；中国植物志 73（1）：4.图版 1：4～5. 1986.

河南：济源，黄楝树林场，曼平，张庆连.王遂义 78212，海拔 1850m；生阴坡林下。

分布：东北及山西、河北、陕西、甘肃、青海、新疆、云南、四川；在河南科、属、种均为首次记录。

桔梗科 Campanulaceae

光叶党参

Codonopsis cardiophylla Diels ex Kom. in Act. Hort. Petrop. 29：117. 1908；中国高等植物图鉴 4：380. 图 6174. 1975；秦岭植物志 1（5）：122. 1985.

河南：嵩县，龙池曼，采集人不详 01035；生海拔 1800 m 以上山坡。

分布：山西南部、陕西、湖北西部；河南首次记录。

菊科 Compositae

钻叶紫菀 铁杆蒿（河南）

Acter subulatus Michx. Fl. Bot. Amer. 2：111. 1803(nec. Steud. 1840).

河南：郑州，时华民无号，朱长山 82003, 86012, 93005；汲县，杨好伟 96001；开封，朱长山 95013；生田野、荒地、沟边、路旁。

分布：北美洲；我国云南、贵州、江西、浙江有逸生；河南首次记录该归化种。

莎草科 Cyperaceae

长咀苔草

Carex longerostata C. A. Mey. in Mem. Acad. St.-Petersb. Sav. Etr. 1：220. t. 11. 1831；北京植物志 2：1312.图 1851. 1984.

河南：嵩县，龙池曼，高增义等 2441；新县，高增义. 何伯安 5262。

分布；黑龙江、吉林、辽宁、河北；河南首次记录。